



RECOLECCIÓN DE MATERIA FECAL PARA ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI, CALPROTECTINAS Y CUERPOS REDUCTORES

- Utilizar recipiente estéril (el mismo que utiliza para recolección de orina)
- Defecar en un recipiente limpio y seco.
- Recolectar de ahí una porción de materia fecal con cuchara o espátula y colocarla en el recipiente estéril.
- Conservar en heladera y llevar al laboratorio dentro de las 24hs de recolección del material.

Indicaciones para niños que no controlan esfínteres.

- Colocar el pañal del bebe dado vuelta (la parte absorbente del pañal que quede contrario a la cola del bebe). Esto es para evitar que la muestra de materia fecal se absorba en el pañal.
- Seguir los mismos pasos del ítem anterior. **IMPORTANTE:** Asegurarse de que la muestra no se contamine con orina.

SOLO PARA HELICOBACTER PYLORI: Dos semanas antes de la recolección del material suspender preferentemente (considerando indicación médica) los siguientes medicamentos:

- Inhibidores de bomba de protones (por ej., omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, etc.)
- Antagonistas del receptor H2 (Por ej., ranitidina)
- Medicamentos que contengan bismuto
- Antibióticos (si estuvo bajo tratamiento para la erradicación de Helicobacter Pylori esperar como mínimo 4 semanas).

NIÑOS que no controlan esfínteres:

- Recoger la muestra mediante el uso de colectores de polietileno comerciales (adquirir en farmacias), evitando la contaminación fecal; o juntar la muestra al acecho.